

Becoplex® vet.

Injektionsvæske, opløsning indeholdende Cyanocobalamin 20 mikrog. Dexpanthenol 12 mg. Nicotinamid 20 mg. Pyridoxinhydrochlorid 2 mg. Riboflavin-natriumphosphat 4,1 mg. Thiaminhydrochlorid 5 mg pr ml.

Præsentation: B-vitaminpræparat til injektion

Virkningsmekanisme/egenskaber: B-vitaminmangel vil bl.a. give sig udtryk i dermatitis, eksem, hårfald, enteritis og appetitmangel. B-vitaminer kan anvendes i forbindelse med rekonvalescens, appetitmangel, utrivlighed og laktation og kan gives som en understøttende behandling ved acetonnæmi, krampetilstande og pareser. Anvendelse af antibiotika og kemoterapeutika af længere varighed kan give forstyrrelser i mikrofloraen i fordøjelseskanalen, hvilket indikerer et tilskud af B-vitaminer som supplement under behandlingen. De vandopløselige B-vitaminer optages hurtigt fra injektionsstedet og deponeres ikke i særlig høj grad. B-vitaminerne indgår i en lang række vigtige enzymer og co-enzymmer, som er af betydning for energiomsætningen af kulhydrater, fedtstoffer og aminosyrer i organismen.

Indikationer: Forebyggelse og behandling af B-vitaminmangel hos husdyr.

Kontraindikationer: Præparatet er kun registreret til IV anvendelse hos kalve og får ved cerebrocortical nekrose. Ved IV injektion til andre dyrearter/andre diagnoser kan dødsfald, ataxi, hjertearrytmi og almen påvirkning ses.

Bivirkninger: Ingen.

Interaktioner: Ingen.

Drægtighed og diegivning: Kan anvendes.

Dosering: Hest og kvæg 10-20 ml (i.m., s.c.), svin og so 10 ml (i.m., s.c.), kalv 5-10 ml (i.m., s.c.), kalve og får: *Cerebrokortikal nekrose:* 20-40 ml i.v. + 20-40 ml i.m, torvegrise (15-25 kg) 5 ml (i.m., s.c.), pattegrise (0-6 uger) 1-2 ml (i.m., s.c.), ræv og hund 2-5 ml (i.m., s.c.), mink 1 ml (i.m., s.c.), fjerkræ ½-1 ml (i.m., s.c.).

Særlige forsigtighedsregler: Ingen.

Overdosering:

Tilbageholdelsestid: 0 dage.

Udlevering: HV

Pakning: 5 x 100 ml

Indehaver af markedsføringstilladelsen er Boehringer Ingelheim Danmark A/S